



## SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE Servizio Personale e organizzazione

Ufficio Programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale

**Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di «Farmacista collaboratore» [1° livello CCNL Assofarm] a tempo pieno e indeterminato presso «Farmacie comunali di Cuneo S.r.l.»**

### Prova scritta

#### TRACCIA 2

Rossi Maria  
Via Delle Rose 11 Cuneo

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 010004000064128  
REGIONE PIEMONTE

TAVOR 20 cpr riv. 2,5 mg 2 conf.  
AULIN OS GRAT 30 BUSTE 100 mg 2 conf.

DR. Bianchi Giovanni  
Via delle Camelie n° 8  
Borgo San Dalmazzo (CN)  
COD.REG. 55566H

FARMACIA CUNEESE  
Cuneo (CN)  
56560

- 1) Il/la candidato/a verifichi la correttezza della ricetta, indichi i formalismi e le modalità prescrittive dei farmaci indicati nella ricetta.
- 2) Il/la candidato/a illustri indicazioni, meccanismo d'azione e proprietà terapeutiche di questi principi attivi.
- 3) Il/la candidato/a scelga la risposta corretta tra quelle proposte ad ogni punto:

- A. Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo distributivo, o la farmacia ne risulti sprovvista, il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica?
- a) Sì, purché non in forma iniettabile
  - b) Sì, ad eccezione dei farmaci che richiedono una prescrizione non ripetibile
  - c) Sì
  - d) Sì, purché di prezzo inferiore al medicinale prescritto
  - e) No
- B. Il medico può apporre sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità del medicinale prescritto?
- a) Sì, sempre
  - b) No, mai
  - c) Sì, solo per i medicinali appartenenti alla classe A
  - d) Sì, solo per i medicinali appartenenti alla classe C
  - e) Sì, ma solo se si tratta di un medicinale generico
- C. L'assorbimento di un farmaco somministrato per via sottocutanea è favorito da:
- a) Contemporanea somministrazione di un vasocostrittore
  - b) Aumento locale del flusso sanguigno
  - c) Abbassamento della temperatura a livello locale
  - d) Shock circolatorio
  - e) Stasi ematica
- D. I valori in mg/100 ml del glucosio nel sangue variano al variare dei soggetti e delle età. Quale, tra gli intervalli sotto indicati, si avvicina maggiormente al valore medio degli adulti sani se il prelievo è stato eseguito su un soggetto digiuno da almeno 10 ore?
- a) 70-110
  - b) 50-80
  - c) 90-120
  - d) 180-210
  - e) 110-130
- E. I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale, tra quelle sotto indicate, evita il cosiddetto "metabolismo di primo passaggio"?
- a) Orale
  - b) Sublinguale
  - c) Transdermica
  - d) Vaginale
  - e) Tutte quelle indicate, tranne una

F. Nel trattamento delle infezioni da *Helicobacter Pylori* si usa l'associazione:

- a) Tetraciclina-gentamicina
- b) Claritromicina-metronidazolo-omeprazolo
- c) Ampicillina-gentamicina-omeprazolo
- d) Tetraciclina-streptomicina
- e) Piperacillina-tobramicina-omeprazolo

G. Per l'autoricettazione di stupefacenti per uso professionale urgente, secondo le previsioni del D.P.R. 309/90 il medico può:

- a) Più di una indicazione è corretta
- b) Rivolgersi direttamente al produttore o al grossista
- c) Utilizzare il ricettario in triplice copia autocopiante per gli stupefacenti dell'Allegato III bis del D.P.R. 309/90
- d) Utilizzare anche il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale
- e) Deve richiedere i medicinali all'Asl di competenza

H. Gli antidepressivi triciclici causano frequentemente:

- a) Tolleranza
- b) Secchezza delle fauci
- c) Dipendenza
- d) Diarrea
- e) Allergia

I. Le immunoglobuline sono:

- a) Macrofagi
- b) Plasmacellule
- c) Linfociti
- d) Anticorpi
- e) Cellule del sistema immunitario

J. L'insulina glargine:

- a) Si può impiegare nel controllo glicemico del diabete di tipo 1 e 2
- b) Ha una lunga durata di azione
- c) Ha minor rischio di dare ipoglicemia, specie notturna
- d) Ha minore tendenza a provocare un aumento di peso rispetto all'insulina NPH (Neutral Protamin Hagedorn)
- e) Tutte le indicazioni sono corrette